



Laidiens: 03.07.2015., Nr. 128
Oficiālās publikācijas Nr.: 2015/128.6

Ministru kabineta noteikumi Nr.357

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 34.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai"

*Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku barības aprites likuma
10.panta pirmo daļu*

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumos Nr. 799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 136. nr.; 2011, 158. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 26.4. un 26.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. Komisijas 2014. gada 6. janvāra Regulā (ES) Nr. 5/2014, ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

26.5. Komisijas 2014. gada 22. oktobra Regulā (ES) Nr. 1123/2014, ar kuru groza Direktīvu 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem (turpmāk – regula Nr. 1123/2014)."

2. Papildināt III nodaļu ar 29.¹, 29.², 29.³, 29.⁴, 29.⁵, 29.⁶, 29.⁷, 29.⁸, 29.⁹ un 29.¹⁰ punktu šādā redakcijā:

29.¹ Ja vienam un tam pašam barošanas mērķim šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 2. ailē ir norādīta vairāk nekā viena būtisko uzturīpašību raksturojuma grupa, pēc ražotāja izvēles var lietot vienu vai abas būtisko uzturīpašību raksturojuma grupas atbilstoši 2. pielikuma tabulas 4. ailē noteiktajām marķējuma norādēm.

29.² Šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 2. un 4. ailē minētās piedevu grupas atbilst noteiktajam būtisko uzturīpašību raksturojumam.

29.³ Ja šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē ir prasīta sastāvdaļu vai analītisko komponentu izcelsme (avoti), izgatavotājs to precīzi norāda marķējumā (norāda, piemēram, sastāvdaļas, dzīvnieku sugas vai dzīvnieka daļas specifisko nosaukumu), lai varētu novērtēt barības atbilstību attiecīgajam būtisko uzturīpašību raksturojumam.

29.⁴ Ja šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē ir prasīta tādas vielas kopējā daudzuma norāde, kas ir arī piedeva, marķējumā norāda dabīgo vielas saturu, ja barībai nekas nav pievienots, vai kopējo tās vielas dabīgo saturu un daudzumu, kura pievienota kā piedeva.

29.⁵ Ja šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē norādīta piezīme "ja tādas ir pievienotas", sastāvdaļu vai piedevu norāda marķējumā, ja tās ir speciāli pievienotas vai palielinātas, lai sasniegtu attiecīgo barošanas mērķi.

29.⁶ Šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 4. ailē minētos analītiskos komponentus un piedevas marķējumā norāda kvantitatīvi.

29.⁷ Šo noteikumu 2. pielikuma tabulas 5. ailē noteiktais ieteicamais lietošanas ilgums ir laiks, kurā būtu jāsasniedz barošanas mērķis. Izgatavotāji lietošanas ilgumu var norādīt precīzāk.

29.⁸ Ja barība paredzēta vairāk nekā vienam īpašam barošanas mērķim, tos norāda marķējumā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.

29.⁹ Marķējumā iekļauj lietošanas instrukciju, kas satur norādījumus īpašiem barošanas mērķiem paredzētas papildbarības dienas devu līdzsvarošanai.

29.¹⁰ Ja īpašiem barošanas mērķiem paredzētu barību laiž tirgū bolu veidā kā tādas barības sastāvdaļas vai papildbarību, kas paredzēta individuālai piespiedu ievadīšanai perorāli, barības marķējumā katrai piedevai, kurai noteikts maksimāli pieļaujamais saturs kompleksajā barībā, norāda bola maksimālo pastāvīgas atbrīvošanās ilgumu un daudzumu, kas atbrīvojas diennaktī. Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma barības aprītē iesaistītais uzņēmējs, kas laiž tirgū bolus, iesniedz pierādījumu par to, ka dienā pieejamais piedevas līmenis gremošanas traktā nepārsniedz piedevas maksimālo saturu, kas noteikts uz kilogramu kompleksās barības visā barošanas periodā (lēnas atbrīvošanās iedarbība). Barību bolu veidā ievada veterinārārsts vai cita barības aprītē iesaistītā persona."

3. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Noslēguma jautājumi".

4. Papildināt noteikumus ar 31. un 32. punktu šādā redakcijā:

"31. Šo noteikumu 2. pielikuma 1., 10., 14., 15. un 18. punktā minēto lolojumdzīvnieku diētisko barību, kas ražota un marķēta līdz 2016. gada 12. novembrim un kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzīvnieku ārstnieciskās barības apriti, kuri bija spēkā pirms regulas Nr. 1123/2014 stāšanās spēkā, atļauts laist tirgū, līdz beidzas tās krājumi.

32. Šo noteikumu 2. pielikuma 29. un 32. punktā minēto dzīvnieku diētisko barību, kas ražota un marķēta līdz 2015. gada 12. maijam un kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzīvnieku ārstnieciskās barības apriti, kuri bija spēkā pirms regulas Nr. 1123/2014 stāšanās spēkā, atļauts laist tirgū, līdz beidzas tās krājumi."

5. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

Dzīvnieku diētiskās barības paredzamā lietojuma saraksts

Nr. p. k.	Īpašās barošanas mērķis	Būtisko uzturīpašību raksturojums	Dzīvnieku suga vai kategorija	Marķējuma norādes	Ieteicamais ilgums	Citi noteikumi
	1	2	3	4	5	6
1.	Nieru darbības uzlabošana hroniskas nieru mazspējas gadījumā ¹	Augstas kvalitātes olbaltumvielas un ierobežots fosfora līmenis (maksimāli 5 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %) un ierobežots kopējā proteīna līmenis (maksimāli 220 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %)	Suņi	Olbaltumvielu avots(-i) Kalcijs Fosfors Kālijs Nātrijs Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)	Sākumā līdz 6 mēnešiem ²	Barību laiž tirgū kā komplekso barību. Ieteicamais viegli sagremojamo olbaltumvielu saturs barībā: vismaz 85 %. Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu." Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."
		vai				
		samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu	Pieauguši suņi	Olbaltumvielu avots(-i) Kalcijs Fosfors Kālijs Nātrijs Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) Lantāna karbonāta oktahidrāts	Sākumā līdz 6 mēnešiem ²	Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu." Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."
		Augstas kvalitātes olbaltumvielas un ierobežots fosfora līmenis (maksimāli 6,2 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %) un ierobežots kopproteīna līmenis (maksimāli 320 g/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %)	Kaķi	Olbaltumvielu avots(-i) Kalcijs Fosfors Kālijs Nātrijs Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)	Sākumā līdz 6 mēnešiem ²	Barību laiž tirgū kā komplekso barību. Ieteicamais viegli sagremojamo olbaltumvielu saturs barībā: vismaz 85 %. Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu." Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim."
		vai				
2.	Urīnākmēņu/struvīta šķīdināšana ³	Urīna pH līmeni pazeminošas īpašības, zems magnija saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte	Suņi	Olbaltumvielu avots(-i) Kalcijs Fosfors Nātrijs Magnijs Kālijs Hlorīdi Sērs Urīna pH līmeni pazeminošas vielas	No 5 līdz 12 nedēļām	Lietošanas instrukcijā norāda: "Vienmēr jābūt pieejamam ūdenim." Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
		Urīna pH līmeni pazeminošas īpašības un zems magnija saturs	Kaķi	Kalcijs Fosfors Nātrijs Magnijs Kālijs Hlorīdi Sērs Kopējais taurīna daudzums Urīna pH līmeni pazeminošas vielas		
3.	Nierākmēņu recidīva mazināšana ³	Urīna pH līmeni pazeminošas īpašības un vidējs magnija saturs	Suņi un kaķi	Kalcijs Fosfors Nātrijs Magnijs Kālijs Hlorīdi Sērs Urīna pH līmeni pazeminošas vielas	Līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
4.	Urātu akmeņu veidošanās	Zems purīnu saturs, zems	Suņi un kaķi	Olbaltumvielu avots(-i)	Līdz 6 mēnešiem,	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā

	mazināšana	olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte			bet neatgriezenisku urīnskābes metabolisma traucējumu gadījumos – visu mūžu	norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
5.	Oksalātu akmeņu veidošanās mazināšana	Zems kalcija saturs, zems D vitamīna saturs un urīna pH limeni paaugstinošas īpašības	Suņi un kaķi	Fosfors Kalcijs Nātrijs Magnijs Kālijs Hlorīdi Sērs Kopējais D vitamīna daudzums Hidroksiprolīns Urīna pH limeni paaugstinošas vielas	Līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
6.	Cistīna akmeņu veidošanās mazināšana	Zems olbaltumvielu saturs, vidējs sēra aminoskābju saturs un urīna pH limeni paaugstinošas īpašības	Suņi un kaķi	Kopējais sēra aminoskābju daudzums Nātrijs Kālijs Hlorīdi Sērs Urīna pH limeni paaugstinošas vielas	Sākumā līdz 1 gadam	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
7.	Sastāvdaļu un barības vielu nepanesības mazināšana ⁴	Atlasītu olbaltumvielu avots(-i) un/vai atlasītu ogļhidrātu avots(-i)	Suņi un kaķi	Olbaltumvielu avots(-i) Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) Ogļhidrātu avots(-i) Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)	No 3 līdz 8 nedēļām; ja nepanesības pazīmes izzūd, barību var lietot neierobežotu laiku	
8.	Akūtu absorbcijas (uzsūkšanās) traucējumu mazināšana zarnās	Paaugstināts elektrolītu un labi sagremojamu sastāvdaļu saturs	Suņi un kaķi	Labi sagremojamās sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams Nātrijs Kālijs Gļotvielu avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)	No 1 līdz 2 nedēļām	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: – "Akūtas diarejas/caurejas periodos un atveseļošanās laikā."; – "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
9.	Nepietiekamas gremošanas kompensācija ⁵	Labi sagremojamās sastāvdaļas un zems tauku saturs	Suņi un kaķi	Labi sagremojamās sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams	No 3 līdz 12 nedēļām, bet hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas gadījumā – visu mūžu	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
10.	Sirdsdarbības veicināšana hroniskas sirds mazspējas gadījumā	Nātrija līmenim jābūt zemākam par 2,6 g/kg loļojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %	Suņi un kaķi	Magnijs Kālijs Nātrijs	Sākumā līdz 6 mēnešiem	Barību laiž tirgū kā komplekso barību. Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
11.	Glikozes regulācija (<i>Diabetes mellitus</i>)	Zems tādu ogļhidrātu saturs, no kuriem ātri izdalās glikoze	Suņi un kaķi	Ogļhidrātu avots(-i) Ogļhidrātu apstrāde pēc vajadzības Ciete Kopējais cukura daudzums Fruktoze (ja tāda ir pievienota) Galveno taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas) Īsas vai vidējas ķēdes taukskābju avots(-i) (ja tādas ir pievienotas)	Sākumā līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
12.	Aknu funkcijas veicināšana hroniskas aknu mazspējas gadījumā	Augstas kvalitātes proteīns, vidējs proteīna saturs, augsts neaizstājamo taukskābju saturs un augsts viegli šķejamo ogļhidrātu saturs	Suņi	Olbaltumvielu avots(-i) Neaizstājamo taukskābju saturs Nātrijs Kopējais vara daudzums	Sākumā līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu." Lietošanas pamācībā norāda: "Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim."
		Augstas kvalitātes proteīns, vidējs proteīnu saturs, augsts neaizstājamo taukskābju saturs	Kaķi	Olbaltumvielu avots(-i) Nātrijs Kopējais vara daudzums	Sākumā līdz 6 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu." Lietošanas pamācībā norāda: "Dzīvniekam pastāvīgi jābūt pieejamam ūdenim."
13.	Lipīdu metabolisma regulācija	Zems tauku un augsts galveno taukskābju saturs	Suņi un kaķi	Galveno taukskābju saturs n-3 taukskābju saturs (ja tādas ir pievienotas)	Sākumā līdz 2 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas vai pirms

	hiperlipidēmijas gadījumā					lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
14.	Joda limeņa samazināšana barībā hipertireoidisma gadījumā	Ierobežots joda līmenis: maksimāli 0,26 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %	Kaķi	Kopējais joda saturs	Sākumā līdz 3 mēnešiem	Barību laiž tirgū kā komplekso barību. Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
15.	Vara limeņa samazināšana aknās	Ierobežots vara līmenis: maksimāli 0,8 mg/kg lolojumdzīvnieku kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %	Suņi	Kopējais vara saturs	Sākumā līdz 6 mēnešiem	Barību laiž tirgū kā komplekso barību. Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
16.	Pārmērīga ķermeņa svara samazināšana	Zema uzturvērtība	Suņi un kaķi	Enerģētiskā vērtība Uzturvērtība	Kamēr sasniedz ķermeņa mērķa masu	Lietošanas instrukcijās jāiesaista piemērotā dienas deva
17.	Dzīvnieka barošana atveseļošanās periodā ⁶	Augsts enerģijas īpatsvars, svarīgāko barības vielu un viegli sagremojamo sastāvdaļu augsta koncentrācija	Suņi un kaķi	Viegli sagremojamas sastāvdaļas, ieskaitot to apstrādi, ja nepieciešams Enerģētiskā vērtība n-3 un n-6 taukskābju saturs (ja ir pievienotas)	Atveseļošanās periods	Ja barība ir paredzēta ievadīšanai pa caurulīti, marķējumā norāda: "Ievadīšana veterinārārsta uzraudzībā."
18.	Dzīvnieka barošana atveseļošanās periodā	Papildbarība var saturēt <i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 koncentrācijā, kas pārsniedz attiecīgo fiksēto maksimālo saturu kompleksajā barībā vairāk nekā 100 reizi	Suņi	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415 un pievienotais daudzums	No 10 līdz 15 dienām	Nodrošina, ka barības lietošanas instrukcijās ir ievērots tiesību aktos noteiktais maksimālais zarnu floras stabilizatora/mikroorganisma saturs kompleksajā barībā. Marķējumā norāda: "Pirms lietošanas un pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
19.	Ādas apmatojuma reģenerācijas veicināšana dermatozes un pārmērīgas spalvu izkrišanas gadījumā	Augsts galveno taukskābju saturs	Suņi un kaķi	Galveno taukskābju saturs	Līdz 2 mēnešiem	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
20.	Metabolisma veicināšana locītavās osteoartrīta gadījumā	Suņiem: – minimālais kopējo omega-3 taukskābju saturs sausnā ir 3,3 %, un minimālais eikozānpentaēnskābes (EPS) saturs sausnā ir 0,38 %; – pietiekams E vitamīna daudzums Kaķiem: – minimālais kopējo omega-3 taukskābju saturs sausnā ir 1,2 %, un minimālais dokozaheksaēnskābes (DHS) saturs sausnā ir 0,28 %; – palielināts metionīna un mangāna daudzums; – pietiekams E vitamīna daudzums	Suņi un kaķi	Suņi: – kopējais omega-3 taukskābju daudzums; – kopējais EPS daudzums; – kopējais E vitamīna daudzums Kaķi: – kopējais omega-3 taukskābju daudzums; – kopējais DHS daudzums; – kopējais metionīna daudzums; – kopējais mangāna daudzums; – kopējais E vitamīna daudzums	Sākumā līdz 3 mēnešiem	Pirms lietošanas vai pirms lietošanas ilguma pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu
21.	Piena triekas riska mazināšana	Zems kalcija saturs	Govis laktācijas periodā	Kalcijs Fosfors Magnijs	No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās	Lietošanas instrukcijā norāda: "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
		un/vai				
		zema katjonu/anjonu attiecība		Kalcijs Fosfors Nātrijs Kālijs Hloridi Sērs	No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās	Lietošanas instrukcijā norāda: "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
		vai				
		augsts ceolīta saturs (sintētiskais nātrijs aluminija silikāts)		Sintētiskā nātrijs un aluminija silikāta saturs	2 nedēļas pirms atnešanās	Lietošanas instrukcijā norāda: – "Ierobežojot barības daudzumu, nepārsniedzot dienas devu 500 g nātrijs aluminija silikāta vienam dzīvniekam."; – "Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt."
		vai				
		augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sāļu veidā		Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un attiecīgais daudzums	No atnešanās sākuma līdz 2 dienām pēc atnešanās	Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: – lietošanas instrukciju, t. i., lietošanas reizes un laiku pirms un pēc atnešanās; – "Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu."
22.	Ketozes riska mazināšana ^{7, 8}	Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots	Govis laktācijas periodā un aitas	Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avoti Propān-1,2-diols (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors) Glicerīns (ja tāds ir pievienots kā glikozes prekursors)	No 3 līdz 6 nedēļām pēc govju laktācijas perioda beigām ⁹ . Pēdējās 6 nedēļas pirms un pirmās 3 nedēļas pēc	