



Laidiens: 02.08.2013., Nr. 149

Oficiālās publikācijas Nr.: 2013/149.6

Ministru kabineta noteikumi Nr.446

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 52.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi"

*Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
30.panta pirmo, otro un trešo daļu un 31.panta piekto daļu*

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.; 2001, 154.nr.; 2002, 3., 177.nr.; 2003, 167., 183.nr.; 2006, 87., 193.nr.; 2007, 93.nr.; 2008, 18., 92.nr.; 2009, 130., 145.nr.; 2010, 196.nr.; 2012, 32., 62.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 3.1.apakšpunktu aiz vārdiem "pneimokoku infekciju" ar vārdiem "rotavīrusu infekciju";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.¹ punktu šādā redakcijā:

"3.¹ Ja bērns nav saņēmis šo noteikumu 3.1. un 3.4.apakšpunktā norādīto vakcīnu, viņam ir tiesības to saņemt līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja to pieļauj vakcīnas lietošanas instrukcija un ja konkrētā vakcīna bija iekļauta vakcinācijas kalendārā, kad bērnam bija šo noteikumu 1.pielikumā norādītais vakcinācijai atbilstošais vecums.";

1.3. aizstāt 18.¹ punkta otrajā teikumā vārdus "un aktualizāciju" ar vārdiem "aktualizāciju un piemērošanu";

1.4. papildināt noteikumus ar 18.² un 18.³ punktu šādā redakcijā:

"18.² Vakcinācijas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona vakcīnas saņemšanas laikā pārliecinās par vakcīnas transportēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību. Vakcinācijas iestāde nepieņem vakcīnu, ja iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotai personai ir objektīvi pamatotas aizdomas par vakcīnas transportēšanas prasību neievērošanu.

18.³ Vakcinācijas iestādē atļauts lietot tikai tās vakcīnas, kuras vakcinācijas iestādei piegādājusi aptieka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju vai zāļu lieltirgotava – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtību.";

1.5. izteikt 26.¹ punktu šādā redakcijā:

"26.¹ Primārās aprūpes ārsta pienākums ir apzināt vakcinācijas statusu tā aprūpē reģistrētajiem pacientiem un nodrošināt vakcinācijas pēctecības uzraudzību.";

1.6. izteikt 1.pielikuma 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3.	2 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP – IPV-Hib-HB1	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV1	
		Rotavīrusu infekcija	RV1	
4.	4 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP – IPV-Hib-HB2	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV2	
		Rotavīrusu infekcija	RV2	
5.	6 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP – IPV-Hib-HB3	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV)
		Rotavīrusu infekcija	RV3	Ja zāļu lietošanas instrukcija paredz vakcīnas pret rotavīrusu infekciju trešo devu"

1.7. izteikt 1.pielikuma 7.punktu šādā redakcijā:

"7.	7 gadi	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomielīts	DTaP-IPV5	Lieto kombinēto vakcīnu ar garā klepus bezšūnu komponentu. Bērnus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV). Vakcinēt pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns uzsāk mācības izglītības iestādē
		Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	MPR2	Pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām vakcinē tikai bērnus, kuri saņēmuši tikai vienu MPR vakcīnas devu. Vakcinēt pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām drīkst sešus