



Laidiens: **10.12.2010., Nr. 196**

Ministru kabineta noteikumi Nr.1103

Rīgā 2010.gada 7.decembrī (prot. Nr.71 22.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi"

*Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
30.panta pirmo, otro, trešo daļu un 31.panta piekto daļu*

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 341./343.nr.; 2001, 154.nr.; 2002, 3., 177.nr.; 2003, 167., 183.nr.; 2006, 87., 193.nr.; 2007, 93.nr.; 2008, 18., 92.nr.; 2009, 130., 145.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 3.1.apakšpunktā vārdus "un rotavīrusu infekciju";

1.2. izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Infektoloģijas centrs) attiecīgā reģiona epidemiologam vakcīnu pasūtījumu kārtējam mēnesim un pārskatu par vakcīnu izlietojumu pārskata mēnesī, aizpildot iedzīvotāju imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapu (3.pielikums). Ja ārpus kārtējā pasūtījuma nepieciešama papildu vakcīna, vakcinācijas iestāde sagatavo un iesniedz Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologam pamatotu rakstisku pieprasījumu konkrētās vakcīnas saņemšanai. Minēto pasūtījumu ieraksta iedzīvotāju imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapā";

1.3. svītrot 10.3.apakšpunktu;

1.4. papildināt noteikumus ar 10.¹ punktu šādā redakcijā:

"10.¹ Ģimenes ārsti katru gadu līdz 10.janvārim iesniedz Latvijas Infektoloģijas centra attiecīgā reģiona epidemiologam pārskatu par iepriekšējā gadā vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinētajām personām katrā ģimenes ārsta praksē atsevišķi, aizpildot vakcinācijas kalendāra ietvaros vakcinēto personu pārskata veidlapu (5.pielikums).";

1.5. papildināt noteikumus ar 18.¹ punktu šādā redakcijā:

"18.¹ Vakcinācijas iestādē, kur uzglabā vakcīnas, ir pasākumu plāns vakcīnu bojājuma novēršanai elektroapgādes pārtraukuma vai ledusskapja bojājuma gadījumā. Par pasākumu plāna izstrādi un aktualizāciju atbild vakcinācijas iestādes vadītājs.";

1.6. aizstāt 57.punktā skaitļus un vārdus "2011.gada 1.janvāri" ar skaitļiem un vārdiem "2014.gada 1.janvāri";

1.7. papildināt noteikumus ar 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Šo noteikumu 10.3.2.apakšpunkts zaudē spēku 2010.gada 20.decembrī.";

1.8. izteikt 1.pielikuma 3., 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

3.	2 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB1	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV1	
4.	4 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB2	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV2	
5.	6 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB3	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV3	
6.	12–15 mēneši	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija un B hepatīts	DTaP-IPV-Hib-HB4	Lieto kombinēto vakcīnu pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu (ar garā klepus bezšūnu komponentu), poliomiēlītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu. Bērnus, kuriem kontrindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomiēlītu (IPV)
		Pneimokoku infekcija	PCV4	–
		Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	MPR1	Lieto kombinēto vakcīnu pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām, iespējams lietot arī kombinēto vakcīnu pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām
		Vējbakas	Varicella1	
7.	7 gadi	Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts	DTaP-IPV5	Lieto kombinēto vakcīnu ar garā klepus bezšūnu komponentu.

			Bērnus, kuriem kontraindicēta vakcīna pret garo klepu, vakcinē ar vakcīnu pret difteriju un stinguma krampjiem (DT) un vakcīnu pret poliomielītu (IPV). Vakcinēt pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns stājas izglītības iestādē
		Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas	MPR2 Pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām vakcinē tikai bērnus, kuri saņēmuši tikai vienu MPR vakcīnas devu. Vakcinēt pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām drīkst sešus gadus vecus bērnus, ja bērns stājas izglītības iestādē"

1.9. izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra
noteikumiem Nr.330

Iedzīvotāju imunizācijas pārskata un vakcīnu pasūtījuma veidlapa

Ārstniecības iestādes nosaukums un adrese

Kods

(ārstniecības personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

Pārskats par iedzīvotāju imunizāciju un vakcīnu pasūtījums

20 ____ .gada ____
(mēnesis)

1.A. Bērnu vakcinācija pret tuberkulozi

Vakcinējamo bērnu vecums	Rindas numurs	Vakcinēto bērnu skaits
A	B	01
Kopā	1	
t.sk. 0–5 dienas*	2	
6 dienas–11 mēneši	3	
Piezīme. * Norāda potes, kas veiktas bērniem 0–5 dienu vecumā, kā arī vēlāk, ja potes jaundzimušajiem veiktas dzemdību nodaļā pirms izrakstīšanas.		

1.B. Vakcīnas atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums	Rindas numurs	Atlikums (devas)	Pasūtījums (devas)
A	B	01	02
Vakcīna pret tuberkulozi (BCG)	1		

2.A. Bērnu vakcinācija pret B hepatītu

Potes	Vakcinējamo bērnu vecums	Rindas numurs	Vakcinēto jaundzimušo un zīdaiņu skaits		Vakcinēto bērnu skaits (14 gadi un vecāki)
			kopā	t.sk. ar monovakcīnu	
A	B	C	01	02	03
1.pote	Kopā	1			
	t.sk. 0–5 dienas*	2			X
	2 mēneši	3			X
2.pote	Kopā	4			
3.pote	Kopā	5			
	t.sk. 6–11 mēneši	6			X
4.pote	Kopā:	7			X
	t.sk. 12–15 mēneši	8			X
Kopā		9			

Piezīme. * Norāda potes, kas veiktas bērniem 0–5 dienu vecumā, kā arī vēlāk, ja potes jaundzimušajiem veiktas dzemdību nodaļā pirms izrakstīšanas.

2.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums	Rindas numurs	Atlikums (devas)	Pasūtījums (devas)
A	B	01	02
Vakcīna pret B hepatītu bērniem	1		

3.A. Bērnu vakcinācija pret difteriju, stinguma krampjiem*, garo klepu, *b* tipa *Haemophilus influenzae* infekciju, poliomielītu un pneimokoku infekciju

Potes	Vakcinējamo bērnu vecums	Rindas numurs	Vakcinēto bērnu skaits pret				
			difteriju un stinguma krampjiem	garo klepu	poliomielītu	<i>b</i> tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju	pneimokoku infekciju
A	B	C	01	02	03	04	05
1.pote	Kopā	1					
	t.sk. 2 mēneši	2					
2.pote	Kopā	3					
3.pote	Kopā	4					
	t.sk. 6–11 mēneši	5					
4.pote	Kopā:	6					
	t.sk. 12–15 mēneši	7					
5.pote	Kopā	8				X	X
	t.sk. 7 gadi	9				X	X
6.pote	Kopā	10		X		X	X
	t.sk. 14 gadi	11		X		X	X
Kopā		12					

Piezīme. * Tai skaitā arī stinguma krampju neatliekamā imūnprofilakse.

3.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums	Rindas numurs	Atlikums (devas)	Pasūtījums (devas)
A	B	01	02

Vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB)	1		
Vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekciju (DTaP-IPV-Hib)	2		
Vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu (DTaP-IPV)	3		
Vakcīna pret difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu (Td-IPV)	4		
Vakcīna pret difteriju un stinguma krampjiem (DT)	5		
Vakcīna pret poliomielītu (IPV)	6		
Vakcīna pret pneimokoku infekciju (PCV)	7		

4.A. Bērnu vakcinācija pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām

Potes	Rindas numurs	Vakcinēto bērnu skaits pret				
		masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām			vējbakām	
		kopā	t.sk.		kopā	t.sk. 12–15 mēnešu vecumā
			12–15 mēnešu vecumā	7 gadu vecumā		
A	B	01	02	03	04	05
1.pote	1					
2.pote	2		X		X	X
Kopā	3		X			X

4.B. Vakcīnu atlikums un pasūtījums

Vakcīnas nosaukums	Rindas numurs	Atlikums (devas)	Pasūtījums (devas)
A	B	01	02
Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu un masaliņām (MPR)	1		
Vakcīna pret vējbakām (varicella)	2		
Vakcīna pret masalām, epidēmisko parotītu, masaliņām un vējbakām (MPR-Var)	3		

5.A. Pieaugušo vakcinācija pret difteriju un stinguma krampjiem*

Potes	Rindas numurs	Vakcinēto personu skaits vecuma grupās (gados)					
		18–29	30–39	40–49	50–59	60 un >	kopā
A	B	01	02	03	04	05	06
1.pote	1						
2.pote	2						
3.pote	3						
Balstvakcinācija	4						
Kopā	5						

Piezīme. * Tai skaitā arī stinguma krampju neatliekamā imūnprofilakse.

6.A. Stinguma krampju neatliekamā imūnprofilakse un pēcekspozīcijas imunizācija pret trakumsērgu

Imunizācijas veids	Rindas numurs	Vakcinēto personu skaits	
		kopā	t.sk. bērni