



Laidiens: 30.12.2005., Nr. 210

Ministru kabineta noteikumi Nr.1040

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 63.§)

Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 32.panta pirmo daļu

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām, lai nodrošinātu vakcinācijas drošības uzraudzību, operatīvi veiktu ar komplikācijām saistīto gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu un, ja nepieciešams, apturētu apšaubāmas kvalitātes vakcīnu lietošanu vai novērstu citus vakcinācijas riska faktorus.

2.Vakcinācijas izraisītās komplikācijas, par kurām ārstniecības persona ziņo, norādītas šo noteikumu pielikumā.

3.Par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām ziņo, ja tās konstatētas šo noteikumu pielikumā norādītajā laika intervālā pēc vakcinācijas.

4.Ārstniecības persona par konstatēto vakcinācijas izraisīto komplikāciju vai pamatotām aizdomām par iespējamām vakcinācijas izraisītajām komplikācijām 12stundu laikā pēc komplikācijas konstatēšanas ziņo valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiālei telefoniski un rakstiski, aizpildot steidzamā paziņojuma veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību.

5.Papildus datiem, ko nepieciešams norādīt saskaņā ar steidzamā paziņojuma veidlapu, norāda komplikācijas rašanās datumu un laiku.

6.Valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" filiāle:

6.1.saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto medicīniskās dokumentācijas lietvedības kārtību reģistrē steidzamo paziņojumu par vakcinācijas izraisīto komplikāciju infekcijas slimību uzskaites žurnālā;

6.2.nekavējoties telefoniski un rakstiski ziņo valsts aģentūrai "Sabiedrības veselības aģentūra" par reģistrēto vakcinācijas izraisīto komplikāciju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 31.decembri.

Pielikums

Ministru kabineta

Vakcinācijas izraisītās komplikācijas

Vakcinācijas izraisītās komplikācijas		Skaidrojums	Laika intervāls pēc vakcinācijas	Vakcīnas
1. Vietējās reakcijas				
1.1.	Abscess injekcijas vietā	Injekcijas vietā audos izveidojies norobežots fluktuējošs veidojums ar saturu. Ar ķermeņa temperatūras paaugstināšanos vai bez tās		
1.1.1.	bakteriāls	Ir iekaisuma pazīmes, strutas, drudzis. Bakteriālā abscesa diagnozi apstiprina iekaisuma izraisītāju — grampozitīvo baktēriju vai neitrofilu — prevalēšana strutu saturā. Dažu minēto pazīmju trūkums neizslēdz šo diagnozi	Dažas dienas/nedēļas	Jebkura parenterāli ievadīta vakcīna
1.1.2.	sterils (auksts abscess)	Bakteriālās infekcijas pazīmju nav	Daži mēneši	Vakcīna pret tuberkulozi (BCG)
1.2.	Limfadenīts (ieskaitot strutaino limfadenītu)	Ir kāda no šādām pazīmēm: 1) palielināts vismaz viens limfmezgls 1,5cm diametrā (pieauguša cilvēka pirksta platumā) vai lielāks; 2) limfmezgla fistula*. *Piezīme. Galvenokārt pēc BCG vakcīnas ievadīšanas, tajā pašā ķermeņa pusē (visbiežāk padusē)	Līdz 12 mēnešiem	Vakcīna pret tuberkulozi (BCG)
1.3.	Izteikta vietējā reakcija	Hiperēmija, infiltrāts un/vai tūska vakcīnas ievadīšanas vietā un viena vai vairākas no šīm pazīmēm: 1) tūska zemāk par tuvāko locītavu; 2) sāpes, hiperēmija, tūska ilgāk par 3 dienām; 3) hospitalizācijas nepieciešamība. Piezīme. Mazāk intensīvas vietējās reakcijas vakcinētiem bērniem novēro samērā bieži, bet parasti tās nav klīniski nozīmīgas, ir īslaicīgas (< 3 dienām). Vakcinācijas komplikāciju epidemioloģiskajai uzraudzībai ziņo par izteiktākajām minētajām vietējām reakcijām	Līdz piecām dienām	Jebkura parenterāli ievadīta vakcīna
2. Centrālās nervu sistēmas (CNS) komplikācijas				
2.1.	Vakcinizraisīts paralītisks poliomiēlīts (akūta šļauganā paralīze (AŠP))	Muguras smadzeņu pelēkās vielas iekaisums ar neiroloģisku simptomātiku — akūtu šļaugano paralīzi, kas saglabājas ilgāk par 60 dienām no slimības sākuma, vai letāls iznākums. Piezīme. Apstiprināts gadījums — slimniekam izdalīts vakcīnas celmam līdzīgs poliovīruss	4—30 dienas ar OPV vakcinētai personai vai 4—75 dienas pēc kontakta ar OPV vakcinēto personu	Perorālā vakcīna pret poliomiēlītu (OPV)
2.2.	Encefalopātija	Smaga, akūta neiroloģiska slimība ar jebkuru no šādiem simptomiem: 1) krampji; 2) izteikti apziņas traucējumi, kas ilgst vienu vai vairākas dienas; 3) izteikti uzvedības traucējumi, kas ilgst vienu vai vairākas dienas	Līdz 48 stundām	Garā klepus komponentu saturošās vakcīnas
			7—12 dienas	Masalu komponentu saturošās vakcīnas
2.3.	Encefalīts	Slimībai raksturīgi 2.2.apakšpunktā minētie simptomi un galvas smadzeņu iekaisuma pazīmes. Daudzos gadījumos muguras smadzeņu likvorā ir pleocitoze un/vai atrodams vīruss	Līdz 4 nedēļām	Garā klepus un masalu komponentu saturošās vakcīnas
2.4.	Meningīts	Smaga, akūta saslimšana ar temperatūras paaugstināšanos, kakla muskulatūras rigiditāti un pozitīviem meningiāliem (Kerniga, Brudzinska)	Līdz 35 dienām	Epidēmiskā parotīta