



Laidiens: 23.07.1999., Nr. 237/238

Ministru kabineta noteikumi Nr. 265

Rīgā 1999.gada 20.jūlijā (prot. Nr. 36, 22.§)

Higiēnas un marķējuma prasības dzīvo gliemeņu piedāvājumam tirgū

*Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
8.panta otro daļu un 13.panta trešo daļu*

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka higiēnas un marķējuma prasības tirgū piedāvājamām dzīvajām gliemenēm (divvāku gliemjiem), kuras pieder pie adatādaiņiem (*Echinodermata*), jūras gliemežiem jeb jūras vēderkājiem (*Gastropoda*) vai tunikātiem (*Tunicata*) un barojas, filtrējot barību no ūdens.
2. Šo noteikumu izpildi kontrolē Zemkopības ministrijas Valsts veterinārais dienests un Labklājības ministrijas Sanitārā inspekcija saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pilnvaru sadalījumu starp ministrijām pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

II. Higiēnas pamatprasības

3. Pārtikā izmanto dzīvas gliemenes, kuras atbilst šādām prasībām:
 - 3.1. vizuāli svaigas, ar tīriem apvalkiem, pie kuriem piesitot dzirdama dobja (timpāniska) skaņa;
 - 3.2. satur gliemenēm raksturīgo iekšējo šķidrumu.
4. Pilnvarotas kompetentas laboratorijas pārbauda dzīvās gliemenes un nosaka to atbilstību šādām prasībām:
 - 4.1. no katras partijas ņemtā vidējā produkta parauga 100 gramu gliemeņu gaļas un iekšējā šķidruma drīkst saturēt ne vairāk par 300 fekālās koliformas šūnām vai ne vairāk par 230 *Echerichia coli* šūnām. Pārbaudi veic ar visticamākā skaitļa metodi (VSM), kas ir daudzņēmēju trīs atšķaidījumu mikrobioloģiskās pārbaudes metode koliformas veidojošo mikroorganismu noteikšanai, vai citu līdzvērtīgu mikrobioloģisku testu;
 - 4.2. no katras partijas ņemtā vidējā produkta parauga 25 gramu gliemeņu gaļas nedrīkst saturēt salmonellas;
 - 4.3. gliemenes nedrīkst saturēt toksiskas, kā arī apkārtējā vidē esošas bioloģiskas izcelsmes nevēlamas vielas;
 - 4.4. radionuklīdu saturs gliemenēs nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo līmeni;
 - 4.5. gliemeņu ēdamajās daļās esošā jūras biotoksīna (planktona aļģēs esošās indīgās vielas) — paralītiskās mīkstmiešu un vēžveidīgo indes — saksitoksīna saturs nedrīkst pārsniegt 80 mikrogramu uz katrām 100 gramu gliemeņu gaļas. Pārbaudi veic saskaņā ar bioloģisko testēšanas metodi, kuru, ja nepieciešams, papildina ar hromatogrāfijas metodi saksitoksīna atklāšanai, vai izmanto citu atzītu testēšanas metodi. Par svarīgākajiem