

ການປ້ອງກັນຜະດູງຄັນ ຫຼື ແພດໝໍທີ່ດູແລສຸຂະພາບຂອງແມ່  
ໃນໄລຍະທີ່ມີການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແມ່ນ  
ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.



ຜະດູງຄັນ ຫຼື ແພດໝໍທີ່ດູແລສຸຂະພາບຂອງແມ່  
ມີສິດໄດ້ນຳໃຊ້ຊຸດປ້ອງກັນ (PPE) ຢ່າງເຕັມສ່ວນ  
ເພື່ອໃຫ້ມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ  
ບົນພື້ນຖານຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ການໃຫ້ກຽດເຊິ່ງ  
ກັນ ແລະ ກັນ ໃນສະຖານທີ່ປະຕິບັດງານ.



ອີງຕາມບົດແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ  
ສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)  
ອ່ານເພີ່ມກ່ຽວກັບ ບົດສັງລວມດ້ານວິຊາການ ສຳຫຼັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ແມ່ຖືພາໃນ  
ໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ທີ່:




<https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-maternity-services>



ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:  
ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕາລີ

ແມ່ທີ່ສົງໄສວ່າຕິດພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈຳເປັນ ຕ້ອງມີການຈັດສັນ ຜ້າອັດປາກໃຫ້ ແລະ ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນເຂດສະເພາະທີ່ກຽມໄວ້ ທີ່ແຍກອອກຈາກຄົນເຈັບລາຍອື່ນໆ




ຖ້າຫາກມີການແພ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ພາຍໃນ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຄົນເຈັບ, ຜູ້ໃກ້ຊິດ ແລະ ແມ່ຍິງທຸກຄົນທີ່ ເຂົ້າມາຮັບການປິ່ນປົວ ຕ້ອງສວມ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມທຸກໆຄັ້ງ.



ອີງຕາມບົດແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ ສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ອ່ານເພີ່ມກ່ຽວກັບ ບົດສັງລວມດ້ານວິຊາການ ສຳຫຼັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ແມ່ຖືພາໃນ ໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ທີ່:


<https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-maternity-services>




ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:  
ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕາລີ

**ຖ້າທ່ານແມ່ນຜະດຸງຄັນ ຫຼື ແພດໝໍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ  
ວຽກງານປະສູດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ສະແດງອາການຂອງ  
ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:**

ໃຫ້ໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນ (PPE) ທຸກຄັ້ງເມື່ອສຳຜັດກັບຄົນເຈັບ ຖ້າມີຊຸດປ້ອງກັນ (PPE) ທີ່ພຽງພໍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ໃຫ້ພິຈາລະນານຳໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດມາຈາກຜະດຸງຄັນ ຫຼື ແພດໝໍທີ່ເບິ່ງແຍງແມ່ຖືພາ.



ໃຫ້ສວມໃສ່ຖົງມື ແລະ ຜ້າຢາງປ້ອງກັນເມື່ອດຳເນີນການປະສູດ ທັງກ່ອນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນທຳອິດຂອງການປະສູດ




ໃຫ້ສວມໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ຜ້າຢາງປ້ອງກັນ, ຊຸດປ້ອງກັນດວງຕາ ແລະ ຖົງມື ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງທຳການປະສູດໃນຂັ້ນທີສອງ ແລະ ທີ່ສາມ



ອີງຕາມບົດແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ອ່ານເພີ່ມກ່ຽວກັບ ບົດສັງລວມດ້ານວິຊາການ ສຳຫຼັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ແມ່ຖືພາໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ທີ່:

<https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-maternity-services>




ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:  
ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕາລີ

ຖ້າທ່ານແມ່ນຜະດຸງຄັນ ຫຼື ແພດໝໍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ  
 ວຽກງານປະສູດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງທີ່ຕົກຢູ່ໃນກໍລະນີສິງໄສ  
 ຫຼື ຍິນຍັນວ່າມີເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ໃຫ້ປະຕິບັດ  
 ການນຳໃຊ້ຊຸດປ້ອງກັນຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:



ເສື້ອຄຸມແຂນຍາວ



ຜ້າອັດປາກອະນາໄມ  
 (ເມື່ອພົບປະກັບຄືນເຈັບທົ່ວໄປ) ຫຼື ໃສ່ຜ້າອັດ  
 ປາກຊະນິດ N95/P2 ຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານ  
 ໃນຂັ້ນຕອນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ



ຊຸດປ້ອງກັນດວງຕາ



ຖືງມືປ້ອງກັນ



ອີງຕາມບົດແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ  
 ສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO)  
 ອ່ານເພີ່ມກ່ຽວກັບ ບົດສັງລວມດ້ານວິຊາການ ສຳຫຼັບການໃຫ້ບໍລິການແກ່ແມ່ຖືພາໃນ  
 ໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ທີ່:  
<https://www.unfpa.org/resources/covid-19-technical-brief-maternity-services>



ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:  
 ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕາລີ

ຖ້າທ່ານແມ່ນຜະດຸງຮັກ ຫຼື ແພດໝໍ ທີ່ກຳລັງກະກຽມ  
ການນຳສິ່ງແມ່ຖືພາໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:



ກະກຽມອຸປະກອນນຳສິ່ງ ແລະ ຢາຕ່າງໆ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນທີ່  
ຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ



ຮັບປະກັນໃຫ້ແພດໝໍນຳສິ່ງທຸກຄົນໄດ້ຮັບຜ້າ  
ອັດປາກລຸ້ນ N95 (ເທົ່າທີ່ຫາໄດ້) ຫຼື ໃສ່ຜ້າອັດ  
ປາກອະນາໄມທີ່ວໄປ ເປັນທາງເລືອກທີສອງ.  
ຮັບປະກັນວ່າແພດໝໍນຳສິ່ງທຸກຄົນ ກໍ່ຕ້ອງໃສ່  
ຊຸດປ້ອງກັນ (PPE) ກ່ອນການນຳສິ່ງ.



ສາມາດໃຊ້ຜ້າອັດປາກລຸ້ນ N95 ໃນໃຫ້ແພດໝໍເດີນທາງ

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5\\_19690](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=5_19690)

